

Kā atpazīt balteņus

Krūkļu baltenis *Gonepteryx rhamni*

Krūkļu baltenis jeb citrontauriņš Latvijā ir ļoti bieži sastopama suga. Pārziemojošie tauriņi pavasarī parādās kā pirmie no balteņiem. Novērojams no marta līdz oktobrim.

G. rhamni



Vienkrāsains dzeltenīgs tauriņš, principā nesajaucams. Tēviņi koši dzelteni, mātītes - zaļganas.

Lapkoku baltenis *Aporia crataegi*

Samērā bieži sastopama suga. Lido no maija beigām līdz jūlijam.

A. crataegi



Paliels, balts tauriņš ar melnu dzīslojumu. Principā nesajaucams, līdzīgākā suga - [cīrulišu dižtauriņš](#).

Dedestiņu baltenis *Leptidea sinapis/juvernica*

Ar dedestiņu balteni Latvijā apzīmē divas vizuāli līdzīgas sugas *L. sinapis* un *L. juvernica*, kuras droši identificēt var pēc ģenitālijām. Dedestiņu balteņi Latvijā samērā bieži sastopami. Lido no aprīļa beigām līdz septembrim.


L. sinapis/juvernica





Spārnu apakšpuses krāsa balta ar pelēcīgu apsarmojumu.

Pieris ģints balteni: **kāļu**, **rāceņu** un **kāpostu** ir ļoti bieži vai bieži sastopamas sugas Latvijā. Tauriņi novērojami no aprīļa līdz pat oktobrim. Kāpostu balteni dabā var viegli atpazīt pēc izmēra, jo ir ievērojami lielāks par kāļu vai rāceņu balteni. Tauriņiem atšķirīgās pazīmes ir spārnu apakšpusēs pelēcīgās apsarmes raksts un pelēko trīsstūru forma spārnu galos.

Kāļu baltenis *Pieris napi*



Spārnu apakšpusē vairāk vai mazāk izteiktas pelēcīgas svītras (apsarmojums gar dzīslām).




Spārnu virspuse balta, tēviņiem bez punktiem vai ar vienu tumšu punktu, mātītēm ar diviem punktiem. Priekšspārnu galos pelēcīgais trīsstūris ar garāko malu gar spārnu ārmalu.

Rāceņu baltenis *Pieris rapae*



Spārnu apakšpusē vienmērīgs, neliels pelēcīgs apsarmojums.




Spārnu virspuse balta, tēviņiem ar vienu tumšu punktu, bet mātītēm ar diviem punktiem. Priekšspārnu galos pelēcīgais trīsstūris ar garāko malu virzienā uz galvu.

Kāpostu baltenis *Pieris brassicae*



Spārnu apakšpusē vienmērīgs, neliels pelēcīgs apsarmojums.



Spārnu virspuse balta, tēviņiem bez punktiem, bet mātītēm ar diviem punktiem. Priekšspārnu galos lieli, tumši pelēki vienādmalu trīsstūri.

Purva dzeltenis *Colias palaeno*

Purva dzeltenis ir sastopams purvos un to apkārtnē. Tauriņi lido no maija beigām līdz jūlijam.

C. palaeno



Spārnu virspuses ārmalas vienmērīgi tumšas.


©Sintija Elferte

Spārni zaļgandzelteni ar smalku sarkanīgu maliņu, mātītēm spārnu virspuse balta. Pakājspārna apakšpuses centrā mazs, balts plankums. Spārnu virspuses ārmalas vienmērīgi tumšas.

Pļavas dzeltenis *Colias hyale*

Pļavas dzeltenis ir sastopams samērā reti. Tauriņus var novērot no maija līdz pat oktobrim.

C. hyale



Priekšspārna gali tumši, bet ar gaišākiem plankumiem.

©Sintija Elferte

Spārni citrondzelteni, apakšpusē spārnu ārmalā nelielu tumšu punktiņu līnija.

Oranžais dzeltenis *Colias croceus*

Oranžais dzeltenis Latvijā ir ļoti rets iecelotājs no dienvidiem. Pēdējo gadu laikā portālā www.dabasdati.lv reģistrēts tikai viens tauriņa novērojums NBS Ādažu poligonā 09.07.2016.

C. croceus ♂



C. croceus ♂



Spārnu apakšpuse dzeltena ar zaļganīgu nokrāsu. Tēviņiem priekšspārnu pamatne oranža, mātītēm - gaiša.

Tēviņiem spārnu virspusē ārmalas vienmērīgi tumšas, bet mātītēm - ar gaišākiem plankumiem.

Spārnu ārmalā nelielu tumšu punktiņu līnija.

©Sintija Elferte

Latvijas sugu sarakstā vēl ir **Zaigojošais dzeltenis, *Colias myrmidone***, kas arī ir ļoti rets iecelotājs. Pēdējo reiz ziņas par tauriņa novērošanu ir no 1999. gada Dagdas apkārtnē.

Kērsu baltenis *Anthocharis cardamines*

Kērsu baltenis ir bieži sastopams. Tēviņus pēc oranži krāsotajiem spārnu galiem var nekļūdīgi identificēt pat lidojumā. Tauriņi lido no aprīļa līdz jūnija beigām.



Mātītēm spārni balti ar melniem spārnu galiem.




Tēviņiem spārni balti ar koši oranžiem spārnu galiem.

Spārnu apakšpuse ar dzeltenzaļu rakstu.

Rezēdu baltenis *Pontia edusa*

Rezēdu baltenis Latvijā ir rets iecelotājs. Tauriņš Latvijā ir novērots karstās vasarās, jūlija beigās un augustā.



Spārnu apakšpuse ar dzeltenzaļu rakstu. Tauriņa specifiskās pazīmes – tumšais plankums spārna virspusē, kas turpinās līdz malai un baltie plankumi spārnu apakšpuses ārmalā, kas paplatinās virzienā uz centru.

Latvijas sugu sarakstā vēl ir **Stepes baltenis, *Pontia chloridice***, kas ir ļoti rets iecelotājs. Vienīgais zināmais eksemplārs ir ievākts Amatā 1932. gadā.